

# **BISOLVON® BROMHEXINA**

**Jarabe - 8 miligramos / 5 mililitros  
120 mililitros**

**VENTA LIBRE**

**INDUSTRIA BRASILEÑA**

**Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento:**

## **¿Qué contiene Bisolvon® Jarabe?**

**Cada envase de 100 mililitros contiene:**

**Clorhidrato de bromhexina..... 160 miligramos.**

Los componentes inactivos son Maltitol líquido, sucralosa, mentol, aroma de cereza, aroma de chocolate, ácido benzoico y agua desmineralizada.

## **Acciones:**

Mucolítico y expectorante (ayuda a disolver el moco facilitando su eliminación)

## **¿Para qué se usa Bisolvon® Jarabe?**

Alivio de los síntomas del catarro bronquial y de la tos, por fluidificación del moco, facilitando la expectoración.

## **¿Qué personas no pueden recibir Bisolvon® Jarabe?**

**NO USE** este medicamento si usted sabe que:

- Es alérgico al principio activo o componentes inactivos de la fórmula
- Bisolvon® contiene 7,5 g de maltitol por dosis diaria total recomendada. Pacientes con intolerancia a la fructosa no deberían tomar esta medicación. Este producto podría tener un leve efecto laxante.
- Tiene úlcera gastroduodenal.
- Tiene dificultad para expectorar.
- Tiene asma.
- Tiene enfermedades de hígado o riñón o alcoholismo.
- Pacientes en tratamiento con Disulfiram.

## **¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Bisolvon® Adultos jarabe?**

Consulte con su médico antes de ingerir este medicamento en los siguientes casos:

- Si está tomando simultáneamente algún medicamento, por ejemplo otros medicamentos para la tos.
- Si va a ser utilizado en personas mayores de 65 años.
- Dado que durante este tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede no ser aconsejable en pacientes con dificultades para expectorar.
- Si usted recibe algún medicamento, está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Se han reportado casos de reacciones adversas en piel de diferente gravedad, asociadas a la administración de Bisolvon /Bromhexina. Si le aparece una lesión en

piel o mucosa (boca, ojos, nariz, genitales) suspenda la medicación y consulte a su médico inmediatamente

#### **POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Reacciones de hipersensibilidad (alergia).

Exantema, urticaria (enrojecimiento, aparición de ronchas)

Reacciones anafilácticas tales como choque anafiláctico, angioedema que puede manifestarse por hinchazón de la piel, tejidos subcutáneos y mucosas de rápida progresión, asociados o no con dificultad para respirar.

Reacciones adversas graves de piel y mucosas (tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica)

#### **¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?**

Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento, como gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal), respiratorios (reacciones alérgicas severas, dificultad para respirar, etc.) y de la piel (picazón, ronchas, hinchazón). Si esto sucede, suspender el tratamiento y consultar al médico.

Si los síntomas del catarro bronquial persisten por más de 2 días o empeoran, consulte inmediatamente con su médico. No administrar este producto por más de 5 días.

#### **¿Cómo se usa Bisolvon® Jarabe?**

Los adultos y los niños mayores de 12 años (más de 30-35 kilogramos de peso) pueden tomar 5 mililitros (correspondiente a 1 vasito) tres veces por día, o sea cada 8 horas. Para niños entre 6 y 12 años (hasta 30-35 kilogramos de peso) la dosis es de 2,5 mililitros (correspondientes a la marca de 2,5 ml del vasito) tres veces por día, o sea cada 8 horas.

El jarabe no contiene azúcar, por lo que puede ser tomado por personas diabéticas.

#### **¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más de la cantidad necesaria?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

"Centros de intoxicaciones: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez tel. (011) 4962-6666/2247, Hospital Alejandro Posadas tel. (011) 4658-7777/4654-6648 y Centro de Asistencia Toxicológica La Plata tel. (0221) 451-5555."

#### **¿Tiene Ud. alguna consulta acerca de Bisolvon® Jarabe?**

ANMAT responde: 0800-333-1234.

sanofi-aventis Argentina S.A. - Línea OTC al 0800 4444 682 (OTC)

**Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.**

#### **Modo de conservación:**

Conservar en su envase original y no almacenar a temperatura superior a 30 grados centígrados.

#### **PRESENTACION:**

Envase con 120 mililitros.

Elaborado por: Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. - Rod.  
Regis Bittencourt (BR 116), Km 286 - Itapeperica da Serra – CNPJ/MF.  
N°60.831.658/0021-10.

**sanofi-aventis Argentina S.A.**

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires

Tel.: 011 4732 5000

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N° 32.976

Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico.

**Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.**

Fecha de última revisión: 11/08/2016. Aprobado por Disposición ANMAT N° 9117/16.