

BISOLHELIX ®
EXTRACTO DE HOJAS DE HIEDRA DESECADAS
(HEDERA HELIX) 0,7g/100 ml

Jarabe – vía oral

VENTA LIBRE

Industria Argentina

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Extracto de hojas de hiedra desecadas (Hedera Hélix) 0,7 g.

Excipientes: Ácido cítrico anhidro; Sorbato de potasio; Carboximetilcelulosa 7 MF; Sorbitol al 70 %; Agua purificada c.s.p. 100ml.

NO USAR SI EL FRASCO Y LA TAPA NO ESTÁN INTACTOS.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Mucolítico.

INDICACIONES:

Alivio sintomático del catarro bronquial.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Posología y forma de administración

Si no se prescribe lo contrario, administrar a los niños de 2 a 5 años: 2,5 ml (media cuchara de la de té), 3 veces por día; a los niños en edad escolar (de 6 a 12 años): 5 ml (una cuchara de la de té), 3 veces por día; y a los mayores de 12 años y a los adultos: 5 a 7,5 ml (una a una cuchara y media de la de té), 3 veces por día. Estas dosis pueden ser modificadas según criterio médico.

AGITAR BIEN EL FRASCO ANTES DE USAR

En caso de malestares persistentes o de aparición de insuficiencia respiratoria, fiebre o también expectoración purulenta o con sangre debe consultar con el médico de inmediato.

Si los síntomas persisten por más de 5 días, consulte con su médico.

CONTRAINDICACIONES:

En caso de intolerancia a la fructosa, el tratamiento sólo debe realizarse después de consultar con un médico.

PRECAUCIONES

El jarabe contiene como principio activo un extracto vegetal y, por ende, su color puede variar ocasionalmente, como todos los preparados elaborados con componentes naturales. Esto, no obstante, no afecta la eficacia terapéutica del preparado. El agente extractivo, etanol 30 % (p/p), sirve para obtener el extracto efectivo para el tratamiento a partir de las hojas de hiedra. El proceso de desecación que se aplica con posterioridad, elimina completamente del extracto el contenido de alcohol.

Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS

En casos raros, Bisolhelix ® puede tener un efecto laxante debido al contenido de sorbitol en el producto.

INTERACCIONES:

No se conocen efectos adversos en el caso de ingestión simultánea con Bisolhelix ® y otros medicamentos.

SOBREDOSIFICACIÓN

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666 / 2247

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777

HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767

OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 150 ml.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco a una temperatura entre 15 y 30 °C.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado en: Av. San Martín 4550, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N° 53.873

Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico.

Última Revisión: 29-06-07– Aprobado por Disposición N° 3753/07.